

Apracur® DN

PARACETAMOL - PSEUDOEFEDRINA - CLORFENIRAMINA MALEATO

VENTA BAJO RECETA

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición:

Cada blister x 6 Comp. Rec. contiene:

4 Comp. Rec. Amarillo - Día

Paracetamol.....500 mg.

Pseudoefedrina.....60 mg.

2 Comp. Rec. Rojos - Noche

Paracetamol.....500 mg.

Pseudoefedrina.....60 mg.

Clorfeniramina Maleato.....4 mg.

Indicaciones

Antigripal. Antifebril. Descongestivo Nasal. Antihistamínico. Alivio de los síntomas de la gripe, resfrió y catarro común. Tratamiento y alivio sintomático de la coriza o resfrió, rinitis alérgica, rinitis vasomotora, congestión nasal o sinusal, otitis media. Combate la cefale, migrañas y fiebre que acompañan a los procesos congestivos sinusales, rino-faringeos y oticos.

Posología

Adultos y niños mayores de 12 años:

1 Comp. Rec. Apracur DN Día, cada 6 u 8 horas.

1 Comp. Rec. Apracur DN Noche, 30 minutos antes de acostarse, siempre alejado por lo menos 4 horas del último comprimido de Apracur DN Día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquier componente de medicamento . Embarazo. Lactancia. No administrar a pacientes con insuficiencia hepática o renal alterada, tampoco a pacientes en tratamiento con antidepresivos (IMAO), a pacientes con enfermedades coronarias graves. De preferencia no usar en pacientes epilépticos.

Reacciones adversas

Entre las reacciones más comunes pueden citarse las de carácter alérgico (rash, cutáneo, prurito, ataques de asma). En menor proporción se puede presentar sequedad bucal, somnolencia, cansancio o debilidad corporal.

Precauciones y advertencias

La clorfeniramina, presente en Apracur Comprimido Noche no es aconsejable para el uso diurno, por la posibilidad de generar somnolencia. Debe administrarse con precaución en pacientes asmáticos, diabéticos, con glaucoma, con hipertrofia prostática o con enfermedades cardiovasculares. La pseudoefedrina puede dar positivo en los controles antidoping.

Por su contenido en paracetamol se debe utilizar con precaución en individuos con deficiencia de glucosa - 6 - fosfato deshidrogenasa.

Interacciones

El uso concomitante de antihistamínicos con alcohol, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros agentes supresores del SNC puede potenciar el efecto sedante de la clorfeniramina. La pseudoefedrina puede inhibir los efectos de los beta-adrenérgicos y en pacientes sometidos a tratamiento con levodopa el uso concurrente puede aumentar la posibilidad de arritmias cardíacas. La eritromicina puede aumentar los efectos adversos de la pseudoefedrina y la clorfeniramina . Con paracetamol interaccionan: busulfán, de hipertensión arterial, pacientcaptopril, carbamazepina, diflunisal, isoniazida, fenitoína, fenobarbital, verapamilo, derivados cumarínicos, indandionas y zidovudina, aumentando la posibilidad de toxicidad hepática.

Restricciones de uso

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Pacientes con antecedentes epilépticos.

No administrar a menores de 12 años.

Sobredosificación

Aunque ninguno de los componentes de la fórmula tiene riesgos potenciales de toxicidad aguda. Síntomas de una posible sobredosis, diarrea, náuseas y vómitos, dolores estomacales, somnolencia severa, mareos, palpitaciones, taquicardia, dificultad respiratoria. En caso de sobredosis acudir al hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en la Avda. Gral. Santos y M. Domínguez, Emergencias Médicas Prof. Dr. Manuel Giagni - Teléfono: 220 418.

Presentación

Caja conteniendo 2 blisters x 6 comprimidos recubiertos.

Autorizado por el M.S.P. y B.S. Registro Sanitario N°: 19153-01-EF.

Conservación

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener en lugar seco a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).



indexpharma

Para: INDEX S.A.C.I.
Boquerón 676 c/ Misiones
Asunción, Paraguay.
Tel.: 021 201 860 - Fax: 021 213 973
Pág. Web: www.index.com.py
D.T.Q.F. Dr. Ernesto Wasmosy M.
Reg. Prof. N° 717

Elaborado por:
Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A.
Avda. Defensores del Chaco Nro.
2567
Villa Elisa, Paraguay.
Reg. Q.F. Edda Caballero
Reg. Prof. N° 2349