

# SULFADIAZINA DE PLATA

## INDEX PHARMA

SULFADIAZINA DE PLATA 1%

LIDOCAINA 0,666%

VITAMINA A (palmitato) 248.000 UI%

CREMA DERMICA

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

**FORMULA:** 100 g de crema contienen: Sulfadiazina de plata 1 g, Lidocaína 0,666 g, Vitamina A (palmitato) 248.000 UI, monoestearato de glicerilo, cera autoemulsionable, vaselina líquida, alcohol cetosteárico, ácido acético, glicerina, propilenglicol, polisorbato 80, metilparabeno, propilparabeno, butilhidroxitoluenol, butilhidroxianisol, agua purificada c.s.

**ACCION TERAPEUTICA:** crema de acción tópica en quemaduras, escaras y heridas de cualquier origen y grado. Antibacteriano, cicatrizante. La Sulfadiazina de plata libera poco a poco el ión plata, cuyo poder bactericida se asocia al poder bacteriostático de la Sulfadiazina. Es eficaz contra los gérmenes gram-negativos, tales como: Pseudomonas aeruginosa (bacilo piocianico), Aerobacter aerógenos (enterobacter), Klebsiella pneumoniae (bacilo de Friedlander o bacilo de Neumann), así como Staphylococcus aureus.

**INDICACIONES:** tratamiento antiséptico y cicatrizante de afecciones dermatológicas infectadas o susceptibles de infectarse, úlceras, quemaduras.

**POSOLOGIA / DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION:** salvo mejor criterio médico, aplicar previo lavado con agua estéril y posterior secado de la lesión, una película de aproximadamente 1,5 a 2 mm de la crema, de manera de cubrir toda la superficie a tratar. Repetir esta operación una vez por día hasta la reepitelización total de la herida o hasta la colocación del injerto.

**CONTRAINDICACIONES:** sensibilidad local o general a alguno de sus componentes, especialmente en niños y ancianos.

- Embarazo, lactancia.
- Prematuros y recién nacidos.
- Insuficiencia renal o hepática.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:** se trata de un medicamento tópico de uso externo. Se absorbe en pequeñas cantidades de acuerdo al tipo y extensión de la lesión, sin significación, salvo en aquellos casos en que exista una expresa intolerancia a la droga por parte del paciente. En pacientes que presenten insuficiencia renal o hepática se deberá monitorear la concentración en suero y orina.

**Interacciones medicamentosas:** se produce un efecto aditivo cuando se combina con agentes bacteriostáticos tipo tetraciclina. Puede presentarse un efecto antagonista cuando se suministra simultáneamente con antibióticos bactericidas. La administración de álcalis acelera la depuración metabólica renal de la Sulfadiazina. La Lidocaína potencia los efectos de la succinilcolina y la concentración plasmática es mayor en pacientes que reciben cimetidina.

**REACCIONES ADVERSAS:** raramente se ha observado hemólisis en pacientes con deficiencia de la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa o eczematización de contacto.

### PRESENTACIONES:

Sulfadiazina de Plata Index Pharma.....Pomo con 50 g.  
Sulfadiazina de Plata Index Pharma.....Pomo con 200 g.  
Sulfadiazina de Plata Index Pharma.....Pote con 400 g.

**CONDICIONES DE CONSERVACION:** conservar a una temperatura entre 5°C y 25°C, bien cerrado, al abrigo de la luz.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 48.432

### DENVER FARMA S.A.

Mozart s/n - Centro Industrial Garin (1619) Escobar -  
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

**Director Técnico:** José Luis Tombazzi - Farmacéutico.

**Servicio de atención al usuario:** 4756-5436

RV 04/08

Importado y Distribuido por: **INDEX S.A.C.I.**  
Boquerón 676 c/ Misiones-Asunción, Paraguay  
D.T.Q.F. Dr. Ernesto Wasmosy M. - Reg. Prof. Nro. 717

Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.

Para:



**indexpharma**