



Matydol[®]

Paracetamol 500 mg

Contra el dolor y la Fiebre

ANALGÉSICO
ANTIPIRÉTICO

VENTA LIBRE EN FARMACIAS

COMPRIMIDOS

VÍA ORAL

Composición:

Cada comprimido de MATYDOL contiene:

PARACETAMOL.....500 mg.

(Equiv. a 556 mg de paracetamol granulado 90%).

Mecanismo de acción:

Paracetamol es un analgésico y antitérmico de eficacia clínicamente comprobada, cuyo efecto se inicia luego de 30 minutos de administrado el activo. Su mecanismo de acción se da predominantemente inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel del Sistema Nervioso Central y en menor grado bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. La acción periférica puede ser también mediante inhibición de la síntesis de prostaglandinas o la inhibición de la síntesis de la acción de otras sustancias que sensibilizan a los nociceptores ante estímulos mecánicos o químicos. La actividad antipirética se da probablemente actuando a nivel central sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura para producir una vasodilatación periférica que da lugar a un aumento del flujo sanguíneo en la piel, de la sudoración y pérdida de calor.

Indicaciones terapéuticas:

Para el tratamiento sintomático de estados dolorosos y febriles. Dolor de cabeza, dientes, dolores musculares, menstruales, alivio de malestar de gripe, resfrío, lumbago.

Posología y Modo de Uso:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas.

Dosis máxima 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg).

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida al Paracetamol. Pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les produzcan asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

Reacciones Adversas; Efectos Colaterales:

Puede producir reacciones alérgicas en la piel. Su uso en sobredosis y/o por periodos prolongados puede producir daño hepático o renal, alteraciones sanguíneas.

Precauciones y Advertencias:

Este producto debe ser administrado con precaución a pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica, o sangrado gastrointestinal.

El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en dosis excesivas.

La ingesta de paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Restricciones de Uso: En caso de embarazo y/o lactancia, consulte a su médico.

Interacciones:

El Paracetamol puede modificar los efectos anticoagulantes orales o de otros antiinflamatorios. Se puede producir hipotermia severa en pacientes bajo tratamiento con fenotiazinas u otros antipiréticos.

Sobredosis:

La sobredosificación aguda por paracetamol en cantidades de 10 a 15g en el adulto puede causar necrosis hepatocelular grave y en menor frecuencia necrosis tubular renal siendo los

primeros síntomas dentro de las 24hs náuseas, vómitos además de letargia, sudoración, pancreatitis, alteraciones miocárdicas y dolor abdominal. Para el tratamiento de la sobredosis se emplea acetilcisteína o metionina vía oral o vía i.v. dentro de las primeras 8hs. de haberse registrado la sobredosis. Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas - Departamento de Toxicología. Teodoro S. Mongelós esq. Gral. Santos - Teléfono: 220418.

Presentación:

Caja conteniendo 10 comprimidos

Conservación:

Conservar a temperatura ambiente (15 a 30°C) y protegido de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.



Más Información en:
www.indexpharma.com.py
tel: 021 283 861



Elaborado por: Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A.
Avda. Defensores del Chaco - Villa Elisa, Paraguay.
Reg. Q.F. Edda Caballero
Reg. Prof. N° 2349

Para: INDEX S.A.C.I.
Boquerón 676 c/ Misiones - Asunción, Paraguay
Autorizado en Paraguay por el M.S.P. y B.S.
Reg. N° 19507 - 01 - EF